

NIHSS – National Institute of Health Stroke Score

1a – Conscience <i>réactivité globale</i>	Vigilant, réagit vivement			0		
	Non vigilant, somnolent, réagit ou répond après stimulation mineure			1		
	Réaction adaptée uniquement après stimulation intense ou douloureuse			2		
	Réaction stéréotypée (<i>neuro-végétative</i>) ou aréactivité totale			3		
1b – Conscience <i>orientation dans le temps : âge, mois</i>	Répond bien à deux questions : son âge et le mois de l'année			0		
	Répond bien à une des deux questions			1		
	Ne répond à aucune des deux questions, aphasique			2		
1c – Conscience <i>exécution d'ordres simples</i>	Exécute bien deux ordres simples : fermer/ouvrir les yeux, fermer/ouvrir une main			0		
	Exécute correctement un ordre sur les deux			1		
	N'exécute aucun des deux ordres (<i>choisir la main non parétique</i>)			2		
2 – Oculomotricité <i>horizontale seule</i>	Mouvements volontaires et réflexe oculocéphalique normaux			0		
	Déviations réductibles du regard			1		
	Déviations forcées ou paralysie complète (<i>malgré les manœuvres oculo-céphaliques</i>)			2		
3 – Champ visuel <i>4 quadrants testés par comptage des doigts</i>	Aucun trouble du champ visuel			0		
	Quadranopsie (<i>Atteinte d'un cadran</i>)			1		
	Hémianopsie complète			2		
	Absence de vision et/ou absence de clignement à la menace			3		
4 – Paralysie faciale <i>montrer les dents, lever les sourcils, fermer les yeux</i>	Mobilité normale et symétrique			0		
	Paralysie mineure (<i>sillon nasogénien effacé, sourire asymétrique</i>)			1		
	Paralysie partielle (<i>concernant la partie inférieure de la face</i>)			2		
	Paralysie faciale complète (faciale supérieure et inférieure)			3		
				G	D	T
5 – Motricité M.Sup	Normale = maintien du membre (<i>90° ou 45°</i>) durant 10 secondes	0	0			
	Maintien possible (<i>90° ou 45°</i>) mais < 10 secondes	1	1			
	Mouvement contre la pesanteur mais pas de maintien possible	2	2			
	Mouvement très limité mais le membre supérieur ne décolle pas du lit	3	3			
	Aucun mouvement possible	4	4			
6 – Motricité M.Inf	Normale = maintien du membre (<i>30°</i>) durant 5 secondes	0	0			
	Maintien possible (<i>30°</i>) mais < 5 secondes	1	1			
	Mouvement contre la pesanteur mais pas de maintien possible	2	2			
	Mouvement très limité mais le membre supérieur ne décolle pas du lit	3	3			
	Aucun mouvement possible	4	4			
7 – Ataxie <i>épreuve doigt nez et talon-genou</i>	Pas d'ataxie (<i>ou déficit moteur déjà pris en compte</i>)			0		
	Ataxie présente pour un membre			1		
	Ataxie pour deux membres			2		
8 – Sensibilité <i>face, tronc, bras, jambe coté AVC</i>	Sensibilité normale			0		
	Discret déficit : piqûre mal perçue			1		
	Déficit sévère à total : piqûre non perçue			2		
9 – Langage	Normal			0		
	Aphasie discrète à modérée : communication difficile mais possible			1		
	Aphasie sévère : expression fragmentaire, communication très limitée			2		
	Mutisme, aphasie globale ou coma			3		
10 – Dysarthrie <i>articulation</i>	Articulation normale			0		
	Dysarthrie discrète à modérée : gênant peu la compréhension			1		
	Dysarthrie sévère : discours inintelligible (<i>aphasie exclue</i>)			2		
11 – Extinction <i>recherche de la négligence</i>	Aucune négligence (<i>ni visuelle, ni tactile, ni spatiale</i>)			0		
	Négligence d'une modalité (<i>visuelle ou tactile ou spatiale</i>)			1		
	Négligence sévère : hémicorps complet, plusieurs modalités			2		
Score total						